

～脳梗塞・心筋梗塞の最大の原因は動脈硬化です～


血管・動脈硬化検査

こんな方におすすめです


- 血圧、コレステロール、血糖、尿酸値が高めといわれたことがある
- 飲酒、喫煙習慣、運動不足がある
- ストレスが多い
- お腹まわり(腹囲、内臓脂肪)が気になる
- 血縁者に心筋梗塞や脳卒中になった方がいる



令和5年(2023年)主な死因の構成割合



(出典:「令和5(2023年)人口動態統計(概数)」厚生労働省 2024.6.5 より作図)



- 内臓脂肪が蓄積すると、高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症とともに血管の動脈硬化を進行させます。
- 動脈硬化は脳梗塞・心筋梗塞の発生リスクを高めますが、かなり進行するまで自覚症状がありません。動脈硬化の進行は、血管年齢や頸動脈超音波検査で具体的に知ることができます。

心筋梗塞・脳梗塞がその多くを占める「心疾患・脳血管疾患」による死亡は合わせて全体の**21.3%**になります

血管・動脈硬化検査のご説明

- **血管年齢検査** ● 両手両足に血圧計を巻き血管の硬さや足の動脈の詰まりを調べ血管年齢を評価します。
- **頸動脈超音波** ● 超音波で直接頸動脈の壁の厚さと狭窄を調べ動脈硬化の程度を評価します。
- **内臓脂肪CT** ● 腹腔内の脂肪の断面積を測定して動脈硬化の原因となる内臓脂肪量を調べます。
- **高感度CRP** ● 動脈硬化で起こるわずかな炎症の有無を調べる血液検査です。
- **LOX-index[®]** ● 血液検査で動脈硬化を促進する蛋白質を測定して脳梗塞・心筋梗塞の将来的な発症リスクを調べます。

コード	検査項目	受診可能な施設			価格(税込)	所要時間または検査方法
		春日	深川	品川		
PJ 01	血管年齢検査(血圧脈波検査)	●	●		4,400円	約10分
PJ 02	頸動脈超音波	●	●	●	6,600円	約10分
PI 01	内臓脂肪CT	●	●		5,500円	約5分
PJ 03	動脈硬化検査(高感度CRP)セット (頸動脈超音波・血管年齢・高感度CRP)	●	●		9,900円	約20分
PJ 04	動脈硬化検査(内臓脂肪CT)セット (頸動脈超音波・血管年齢・内臓脂肪CT)	●	●		12,100円	約20分
PS 11	LOX-index [®]	●	●	●	15,400円	採血

※ 時間の表記は検査そのものにかかる時間で、前後の移動や準備、採血等の時間は含まれません。