



オプション検査の
ご案内

脳梗塞・心筋梗塞の 最大の原因は動脈硬化です

予約なしでもお受けになれます
スタッフにお声をかけてください


血管・動脈硬化検査



こんな方にオススメの検査です。

- 血圧、コレステロール、血糖、尿酸値が高めと言われたことがある
- 飲酒、喫煙習慣がある
- 血縁者に心筋梗塞や脳梗塞になった方がいる
- 動脈硬化になっていないか気になる

■ 主な死因別死亡数の割合



**心筋梗塞・脳梗塞が
その多くを占める、
心疾患・脳血管疾患による
死亡はあわせて
全体の**23.4%**になります**

出典:厚生労働省2017年人口動態統計月報年計より

内臓脂肪が蓄積すると、高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症とともに
血管の動脈硬化を進行させます。

動脈硬化は脳梗塞・心筋梗塞の発生リスクを高めますが、
かなり進行するまで自覚症状がありません(そのためサイレントキラーと呼ばれます)。
動脈硬化の進行は、血管年齢や頸動脈超音波検査で具体的に知ることができます。



様々な角度から動脈硬化の度合いをチェック。

PJ01	血管年齢検査(血圧脈波検査)	¥3,000+税	約10分※	両手両足に血圧計を巻き、同時に測定することで動脈の硬さと足の血管の詰まりを調べます。
PJ02	頸動脈超音波	¥5,000+税	約10分※	超音波で直接、頸動脈の壁の厚さと狭窄の具合を調べます。
PJ03	動脈硬化検査(高感度CRP)セット	¥7,000+税	約20分※	血管年齢検査と頸動脈超音波に加えて、採血で高感度CRPを測って動脈硬化で起こるわずかな炎症の有無を調べます。
PJ04	動脈硬化検査(内臓脂肪CT)セット	¥9,500+税	約25分※	血管年齢検査と頸動脈超音波に加えてCTで内臓脂肪を測定します。腹囲が大きい方におすすめです。

※時間の表記は検査そのものにかかる時間で、前後の移動や準備の時間は含まれません。



医療法人社団 同友会

Copyright © 2019 同友会グループ All Rights Reserved.

20190820